

Temat: W Amazonii.




Źródło grafik: <https://www.google.pl/search?q=amazonia+ameryka+południowa+geografi+&tbn=isch&source>

1. Największą niziną na świecie i kontynencie drugą niziną w Ameryce Południowej, jest Nizina Amazonki, znajduje się ona w dorzeczu Amazonki, prawie cała leży na terytorium Brazylii. Rozlega się na powierzchni około 5 mln km².

AMERYKA POŁUDNIOWA - RZEŻBA TERENU

skala 1 : 20 000 000

40 000 km²



2. Największą rzeką Ameryki Południowej i świata, jest Amazonka, płynąca na długość 6400 km.

Nizina Amazonki ma charakter płaskiej nieckowatej równiny, występują tu liczne dopływy głównej rzeki - Amazonki. Nizina objęta jest strefą klimatu równikowego o odmianie wilgotnej. Rosną tu bogate w gatunki roślinne lasy równikowe, m.in. drzewa kauczukowe, mahoniowe.

Nizina Amazonki, należy do obszarów słabo zaludnionych, Podstawową formą działalności ludzi jest rybołówstwo, pasterstwo oraz myślistwo.


Występują złoża ropy naftowej i rud manganu.

3. Na obszarze delty Amazonki znajdują się liczne wyspy, największą z nich jest Marajó.

NAJWIĘKSZE DOPIŁYWY:

Jaruá, Purus, Madeira, Tapajós, Xingú, Tocantins, Paru, Jari.

4. Głównym elementem środowiska przyrodniczego Amazonii są wilgotne lasy równikowe, które w tej części świata nazywa się **selwą**.



AMERYKA PŁD. ROZCIĄGA SIĘ PRZEZ WSZYSTKIE STREFY KLIMATYCZNE,

- równikowej na północy,
- zwrotnikową,
- podzwrotnikową,
- umiarkowaną do subpolarnej na krańcu południowym;
- w Andach klimat chłodny, górski z wyraźną piętrowością.

ŚREDNIA MIESIĘCZNA TEMP.

- na Niz. Amazonki wynosi 24–28°C,
- na Ziemi Ognistej 1–14°C;

ŚREDNIE ROCZNE OPADY:

- 4000 mm w Amazonii,
- najw. ok. 7000 mm na zach. stokach Kordyliery Zach.
- w Kolumbii, najniższe ok. 50 mm
- w środk. Andach (pustynia Atacama),
- ok. 300 mm w Patagonii.

Rzeki w 85% należą do zlewiska O. Atlantyckiego, 7% odprowadza wody do Pacyfiku, 8% stanowią tereny bezodpływowe.

Roślinność Ameryki Płd. w znacznej części zachowała jeszcze swój pierwotny charakter, mimo – niejednokrotnie rabunkowej – gospodarki człowieka; w dorzeczu Amazonki gł. formacją roślinną jest wilgotny, wiecznie zielony las równikowy (**dżungla**), nad Orinoko dominują sawanny (**llanos**); wnętrze Wyż. Brazylijskiej, Gran Chaco i Mato Grosso zajmują gł. kolczaste lasy – **caatinga** i kserofityczne zarośla; w wilgotnej części Wyż. Brazylijskiej **lasy araukariowe**; na nadmorskich terenach **namorzyny**; środkową Argentynę i Urugwaj pokrywa **pampa** (o charakterze stepowym); na przedgórzach andyjskich wysokogórskie stepy (**puna**) oraz zimozielone, twarde listne zarośla, sporo **endemitów**; w Patagonii **stepy i półpustynie**, przechodzące na Ziemi Ognistej w **tundrę**.

Z Ameryki Płd. pochodzi wiele roślin uprawnych, m.in.: ziemniak, pomidor, ananas, papryka, kakaowiec, tytoń.

Zwierzozostan bogaty i zróżnicowany; 32 rodziny ssaków, w tym 16 endemicznych: jaguary i pumy, liczne gat. małp, mrówkojady, tapiry, lamy, pancerniki, dydelfy, nutrie, szynszyle, świnka morska, kapibary, aguti, nietoperze wampiry; z gadów m.in. anakondy i grzechotniki, kajmany, z ryb piranie, dwudyszny płazinięć, z ptaków kondory, nandú, papugi, kolibry, tukany.

Źródło: <https://encyklopedia.interia.pl/geografia-nauki-pokrewne/kontynenty/news-ameryka-poludniowa>



PRACA W GRUPACH

- I – Gospodarcza eksploatacja Amazonii.
- II – Ekologiczne następstwa wylesiania Amazonii.
- III – Wilgotny las równikowy.